


# Veilige zorg van centraal veneuze katheter (CVK) voor mensen met thuis TPV en/of vocht

1

Geef aan dat de centraal veneuze katheter (CVK) uw levenslijn is



2

Attendeer uw zorgverlener erop dat handhygiëne bij gebruik van de centraal veneuze katheter (CVK) van levensbelang is




3

Volg instructies en protocollen voor een veilige zorg van uw centraal veneuze katheter (CVK) goed op



4

Sta er op dat uw centraal veneuze katheter (CVK) alleen gebruikt wordt voor TPV of vocht



5

Meld het meteen aan uw zorgverlener als u koorts krijgt



6

Aarzel niet om uw zorgverlener aan te spreken



# Veilige zorg van centraal veneuze katheter (CVK) voor mensen met thuis TPV en/of vocht



Informeer uw zorgverlener dat u TPV en/of vocht via de centraal veneuze katheter (CVK) toegediend krijgt en leg uit waarom dat is. Bijvoorbeeld omdat u niet voldoende voeding opneemt door ernstig darmfalen. Bij onjuist en/of niet hygiënisch handelen komt de voeding/vochtvoorziening ernstig in gevaar.



Uw zorgverleners zijn op de hoogte van de hygiënevoorschriften. Hierdoor verkleint de kans op besmetting met bacteriën.

Als u merkt dat iemand:

- geen juiste handhygiëne toepast (handen wassen, afdrogen met papieren handdoek, 30 seconden inwrijven met handalcohol);
- sieraden draagt;
- geen juiste wondzorg uitvoert/doet;
- ... spreek diegene daar dan op aan.



Handel steriel bij het wisselen van de bionector. Spuit de CVK na afkoppelen door met zoutoplossing (NaCl 0,9%) en sluit de CVK vervolgens (bij voorkeur) af met Taurosept®. Inspecteer dagelijks de insteekopening en het gebied rondom de CVK. Merkt u iets ongewoons aan uw CVK, bijvoorbeeld lekkage, neem dan contact op met uw darmfalencentrum.



Uw CVK is alleen bedoeld voor TPV- en vochttoediening en niet voor bloedafname. Bij onjuist gebruik is er een verhoogd risico op infectie. Dit geldt ook voor bloed terugtrekken voor de start van TPV. Alleen voor het maken van een bloedkweek is terugtrekken van bloed uit de CVK nodig. Toevoegen van kranenblokken vergroot de kans op infectiegevaar, gebruik liever een Y-stuk. Spreek uw zorgverlener erop aan als er dingen mis dreigen te gaan.



Bij koorts (38,5 graden of hoger) of koude rilling kan de CVK geïnfecteerd zijn. Er moeten bloedkweken gemaakt worden uit de CVK en ook uit de arm. Start direct met antibiotica, dit kan in overleg met uw eigen darmfalencentrum. De CVK hoeft NIET verwijderd te worden als deze goed met antibiotica behandeld kan worden.



Geef aan als iets niet duidelijk is of als u vragen heeft. Meld het als er iets gebeurt wat niet de bedoeling is. Bij u is een goede hygiëne van levensbelang. Geef het aan als uw zorgverleners niet hygiënisch werken of iets niet volgens uw eigen handelwijze gaat. Dit is in uw belang.

Met deze patiëntveiligheidskaart weten mensen met TPV nog beter hoe zij kunnen zorgen voor een veilige verzorging van hun intraveneuze katheter en kunnen zij hun zorgverlener hier op aanspreken. Deze patiëntveiligheidskaart is opgesteld in samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN), Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en Radboudumc in Nijmegen.